

Assortiment variétal 2012

Résultats des essais variétaux 2009 - 2011 du Centre betteravier suisse

Variété	Obtenteur	Couleur de l'enrobage	Rend. racines valeur relative ¹⁾	Teneur en sucre valeur relative ¹⁾	Rend. en sucre* valeur relative ¹⁾	Produit brut** valeur relative ¹⁾	Extractibilité %	Levée au champ %	Doubles germes %	Cercosporiose*** note
ROBINSON	<i>Strube</i>	bleu	97.5	101.0	99.0	100.0	90.2	91.8	0.8	3.1
DEBORA	<i>KWS</i>	orange	101.2	101.9	103.3	103.5	89.9	90.1	0.6	4.4
SVENJA	<i>KWS</i>	orange	94.9	103.8	99.4	101.8	90.6	90.3	1.1	4.2
PASTEUR	<i>Strube</i>	bleu	107.4	97.9	105.4	103.3	90.0	92.8	3.1	4.8
FELIXA	<i>KWS</i>	orange	103.1	100.9	104.0	103.4	89.8	91.8	0.5	4.0
ELAINA	<i>KWS</i>	orange	99.3	101.9	101.5	102.2	90.0	89.8	1.5	2.3
RIBERA	<i>Syngenta</i>	bleu	101.3	101.7	102.8	102.6	89.6	89.7	1.9	3.7
Variétés spéciales:										
SYNCRO	<i>Syngenta</i>	bleu	variété réservée aux sites infestés de rhizoctone brun							
AMALIA	<i>KWS</i>	orange	variété destinée aux sols infestés par heterodera schachtii (nématodes à kyste)							
ROBINSON bio	<i>Strube</i>	gris	variété pour la culture biologique (semence non traitée)							

Remarques

- toutes les variétés sont résistantes à la rhizomanie
- ¹⁾ 100 = moyenne des variétés de référence
- * rendement en sucre: = rendement en racines x teneur en sucre x extractibilité
- ** produit brut: = prix de base quota A, plus les majorations ou déductions pour la teneur en sucre et l'extractibilité plus prime spécifique à la surface
- *** cercosporiose: 1 = feuillage sain; 9 = feuillage détruit